



Novano

Middenlaat ras met een hoge zetmeelopbrengst, goede AM. en zeer goede wratziekte resistenties.

Bemesting

P en K normaal.

Stikstof:

dalgrond gemiddeld 180 – 240 N,

zandgrond gemiddeld 200 – 250 N.

Gedeelde stikstofgift heeft de voorkeur.

Poten

Goede behandeling tegen rhizoctonia uitvoeren.

Goede behandeling tegen vrijlevende alen uitvoeren.

Normale pootafstand en pootdiepte toepassen.(29-33cm)

Vroeg poten.

Voorbehandeling

Zeer weinig kiemlustig

Zorgen dat er witte puntjes

zijn bij het poten, beslist noodzakelijk.

Eventueel vlak voor het poten nog goed opwarmen.

Groeikenmerken

Normale opkomst.

Gemiddeld aantal stengels.

Sterk loof, goed dekkend, beter is dat het loof wat gaat liggen (hokkerig).

Blauwviolet/lila bloemen.

Meer dan gemiddeld knolaantal.

Gevoelig voor laat gebruik van Sencor.

Middenlate afrijping (4,5).

Knolvorm rond ovaal - witvlezig

Ziekten en plagen

Am. resistentie :	Ro 1,4	9	Yn-virus:	Zeer weinig vatbaar	9
	Ro 2,3	7	Phytophthora	Loof :zeer weinig vatbaar	8
	Pa 2	8		Knol : zeer weinig vatbaar	8,5
	Pa 3	9			
Am. tolerantie :	tolerant	7	Schurft:	Middelmatig vatbaar	6
wratziekte:					
fysio 1/2/6:	resistent	10	Erwinia:	Weinig vatbaar	
fysio 8/18:	resistent	10			

Oogst en bewaring.

Vroeg goed te rooien

Weinig gevoelig voor rooibeschatiging

Zeer goed te bewaren

Aspecten die extra aandacht verdienen

Vanwege goede virusresistenties geen minerale olie gebruiken in de pootgoedproductie.Alert zijn op alternaria, gewas groen houden - bladbemesting N-K-Mg-Mn. Novano is een ras dat tegen lage produktiekosten een goed resultaat weet te halen.