

Rasbeschrijving : Spunta

| | |
|---------------------|---|
| Kruising | : B a x USDA 96 - 56 |
| Bestemming | : Zeer geschikt als tafelaardappel in Zuid Europa, Noord Afrika en het Midden Oosten. |
| Rijptijd | : Middenvroeg |
| Knollen | : Lang, iets peervormig en erg grof, vlakogig. De schil- en vleeskleur is lichtgeel. |
| Opbrengst | : Hoog (zelfs onder moeilijke omstandigheden), uniforme sortering. |
| Drogestofgehalte | : Matig |
| Opslag geschiktheid | : Redelijk goed, met een gemiddelde kiemrust. Erg gevoelig voor Fusarium. |
| Kooktype | : Redelijk vastkokend, kooktype B, geen verkleuring na koken. |
| Resistentie ziekten | : AM - resistentie : vatbaar |
| | Phytophthora loof : tamelijk vatbaar |
| | Phytophthora knol : tamelijk vatbaar |
| | Schurft : matig resistent |
| | A - Virus : resistent |
| | Yn - Virus : redelijk resistent |
| | X - Virus : matig resistent |
| | Bladrolvirus : redelijk resistent |
| | Wratziekte fysio 1, 2 & 6 : onvatbaar |

Teeltaanwijzingen

| | |
|------------|---|
| Grondsoort | : Niet uitpoten op schurftgevoelige gronden. Een goede bodemstructuur is een vereiste om misvorming van de knollen te voorkomen. |
| Teelt | : Voorkiemen is wenselijk. Omdat Spunta vrij gevoelig is voor onderzee vorming, dient er niet te vroeg in een relatief koude grond gepoot te worden. Een nauwe plantafstand is aan te bevelen. Spunta is gevoelig voor rooibeschatiging. Voor het rooien dienen de knollen voldoende afgehard te zijn. Spunta heeft een goede droogte- en hitteresistentie. |
| Bemesting | : Een matige stikstofbemesting. Spunta is gevoelig voor magnesiumgebrek. Een Mg-gift kan nodig zijn. |
| Bewaring | : Spunta is redelijk goed bewaarbaar. Beschadigingen kunnen de bewaarbaarheid aanzienlijk verminderen i.v.m. de sterke vatbaarheid voor Fusarium. Het is daarom noodzakelijk om direct na de oogst een goede wondheling toe te passen! |

Voor inlichtingen & verkoop :

Th. Hof en Zn. B.V.
Zwolseweg 163
7707 AE Balkbrug
tel. 0523 – 656 341
www.hofbalkbrug.nl

